

12.04.2017

**РІКАРФА 100 мг таблетки зі смаком м'яса для собак
(таблетки)
листівка-вкладка**

Опис

Круглі, мармурові таблетки темно коричневого кольору з темними плямами зі скошеними краями та насічкою на одному боці.

Склад

1 таблетка (380 мг) препарату містить діючу речовину:

карпрофен – 100 мг.

Допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, заліза оксид червоний, заліза оксид чорний, повідон К30, натрію крохмальгліколят, кремнію діоксид колоїдний безводний, ароматизатор м'ясний 10022, тальк, магнію стеарат.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код QM01 – протизапальні і протиревматичні ветеринарні препарати. QM01AE91 – Карпрофен.

Карпрофен – це нестероїдний протизапальний препарат, що виявляє протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дії шляхом інгібування ферменту циклооксигенази в циклі арахідонової кислоти. Він у терапевтичних дозах інгібує переважно циклооксигеназу-II, забезпечуючи протизапальний і жарознижувальний ефект, і не впливає на циклооксигеназу-I, що забезпечує мінімальний розвиток побічних ефектів, таких, як кровотечі, утворення виразок і порушення функції нирок. Препарат має антибрадикінінову активність, пригнічуючи сприйняття болю на рівні центральних відділів головного і спинного мозку.

Карпрофен майже повністю (90%) всмоктується після перорального застосування та зв'язується з білками. Максимальна концентрація карпрофену в крові спостерігається протягом 1-3 годин після застосування. В організмі собак карпрофен метаболізується в печінці. Кінцевий період напіввиведення у собак становить 10 годин. Карпрофен виводиться з організму, головним чином, з фекаліями (70 -78 %) та сечею (10 -20 %).

Застосування

Лікування собак при гострих та хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату та дегенеративних захворюваннях суглобів, при запальних та больових явищах у м'яких тканинах. Підтримуюча терапія під час парентеральної аналгезії у післяопераційний період.

Дозування

Перорально у дозі 2-4 мг карпрофену на 1 кг маси тіла на добу. Добову дозу слід розділити на дві частини та приймати двічі на добу. Залежно від клінічної реакції у відповідь на лікування, дозу можна зменшити через 7 діб до 2 мг карпрофену на 1 кг маси тіла на добу одноразово.

Тривалість лікування становить 14 діб. Лікування хронічних захворювань у собак може тривати довше. Довготривале лікування повинне проходити під постійним наглядом лікаря ветеринарної медицини.

Протипоказання

Підвищена чутливість до карпрофену та інших інгредієнтів препарату.

Не застосовувати у період вагітності та лактації.

Не застосовувати тваринам з розладами серця, печінки або нирок, при можливості появи виразок травного каналу.

Не застосовувати препарат котам.

Не слід застосовувати цуценятам молодше 4-х місяців.

Не застосовувати собакам з ознаками патологічних змін крові.

Не застосовувати одночасно із нестероїдними протизапальними препаратами.

Застереження

З обережністю застосовувати собакам з ознаками зневоднення, гіповолемією або гіпотонією, через ризик підвищення токсичності для нирок.

12.04.2017

Слід уникати застосовувати одночасно та протягом 24 годин після останнього застосування препарату з іншими нестероїдними протизапальними засобами, глюкокортикоїдами та засобами, токсичними для нирок.

Форма випуску

10 таблеток в блістері, 2 або 5 або 10 або 50 блістерів в картонній упаковці.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5° до 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці.

Термін придатності – 3 роки. Половину таблетки можна повернути до блістера та використати протягом 24 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново место,
Республіка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia

Виробник готового продукту

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново место,
Республіка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia